

Een vroeg, vastkokend tafel- en saladeras met een goede schurftresistentie.

- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Hoog knolaantal
- ✓ Goede Y-virusresistenties



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** N.Ö.S.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2040
- ⊙ **Kruising:** MARABEL x AR 88-0156
- ⊙ **Zaailingnummer:** NO 98-0132

Marktsegment

- ⊙ **Retail** | Vers
- ⊙ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	gemiddeld / 6,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 6,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeisceuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	337
Drogestofgehalte	18,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,6

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol	zeer vatbaar / 4

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	vatbaar / 5,5
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

30/50: 23 cm (58000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Erika vatbaar is.

Oogst

Drie weken wachten met rooien na loofdoding is noodzakelijk, omdat Erika vrij gevoelig is voor stootblauw en weinig gevoelig voor rooibeschatiging.

Bewaring

Erika heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl