

# Kuras.

Een laat ras voor de zetmeelteelt met resistentie tegen aardappelmoeheid (RO1, 2, 3, 4) en een zeer goede zetmeelopbrengst.

- ✓ Witte vleeskleur
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Goede resistentie tegen virus en Phytophthora



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** G. Kuper
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2023
- ⊙ **Kruising:** PG 285 x AR 69-0491
- ⊙ **Zaailingnummer:** KU 80-1271

## Marktsegment

- ⊙ **Verwerkende industrie** | Zetmeel

P

## Plant- en knolkenmerken

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Rijptijd                      | laat / 4          |
| Bloemkleur                    | wit               |
| Hoeveelheid bessen            | geen / 4          |
| Loof: - ontwikkeling begin    | vrij snel / 7     |
| Loof: - ontwikkeling volledig | vrij snel / 7,5   |
| Loof: - selecteerbaarheid     | gemiddeld / 6     |
| Loof: - stevigheid plant      | vrij stevig / 7,5 |

## Gevoeligheid en kwaliteit

|            |  |
|------------|--|
| Kiemrust   | gemiddeld / 5,5                        |
| Metribuzin | weinig gevoelig / 7                    |
| Bentazon   | niet getest / -                        |
| Talent     | gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7 |
| Ethyleen   | niet getest / -                        |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Doorwas           | redelijk gevoelig / 6 |
| Groeischeuren     | weinig gevoelig / 7   |
| Blauwgevoeligheid | redelijk gevoelig / 6 |
| Rooibeschaadiging | gevoelig / 5,5        |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht   | 490             |
| Drogestofgehalte    | 25,9%           |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte       | 33,8            |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Chipskwaliteit              | onvoldoende / 4,5   |
| Frietkwaliteit              | matig / 5,5         |
| Kooktype                    | kruidig / C         |
| Rauwverkleuring             | niet getest / -     |
| Grauwverkleuring (na koken) | zeer gevoelig / 4,5 |

Say potato,  
say **Agrico.**

# Kuras.

## Resistenties

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F) | resistent / 9     |
| Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C) | resistent* / 9*   |
| Aardappelmoeheid Pa 2 (D)     | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoeheid Pa 3 (E)     | niet aanwezig / - |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Phytophthora loof | weinig tot niet vatbaar / 8 |
| Phytophthora knol | weinig tot niet vatbaar / 8 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schurft        | vatbaar / 5,5        |
| Poederschurft  | weinig vatbaar / 6,5 |
| Fusarium       | weinig vatbaar / 7   |
| Erwinia        | vatbaar / 5          |
| Zwarte spikkel | niet getest / -      |
| Kringerigheid  | weinig vatbaar / 6,5 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Virus Bladrol | weinig vatbaar / 7            |
| Virus A       | weinig tot niet vatbaar / 9   |
| Virus X       | weinig tot niet vatbaar / 8,5 |
| Virus Yn      | weinig tot niet vatbaar / 8   |
| Virus Yntn    | weinig tot niet vatbaar / 9   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Wratziekte F1 (D1)  | resistent / 10    |
| Wratziekte F6 (O1)  | matig vatbaar / 5 |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / - |

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)  
 35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Kuras vrij resistent is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Kuras weinig gevoelig is voor rooibeschatting en enigszins gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Kuras heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 9 graden Celsius.

Say  
 growth,  
 say **Agrico.**

\* Resultaten met een sterretje (\*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)

