

Een middenlaat consumptieras met goede hitte- en virusresistenties en een hoge opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Midden late rijptijd
- ✓ Hoog onderwatergewicht



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** J. Oldenburger
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** BEA x USDA 96-56
- ⊙ **Zaailingnummer:** Oldenburger 57-88

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	zeer gevoelig / 4

Onderwatergewicht	387
Drogestofgehalte	21%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	matig / 5,5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Spunta.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	vatbaar / 2
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	vatbaar / 2

Phytophthora loof	vatbaar / 5,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
 35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Spunta vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Spunta gevoelig is voor rooibeschatiging, maar weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Spunta heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden).

Say
 growth,
 say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl