



Een laat zetmeelras met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Geschikt voor lange bewaring
- ✓ Goede virusresistenties

## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** AKV Langholt
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- ⊙ **Kruising:** STAYER x AR 02-3921
- ⊙ **Zaailingnummer:** PL 08-4007

## Marktsegment

- ⊙ **Verwerkende industrie** | Zetmeel
- ⊙ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij veel / 7
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	lang / 7,5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	gemiddeld meer dan 25% meer knollen / 8
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeisceuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	471
Drogestofgehalte	25,2%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	15,37

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	weinig vatbaar / 6
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	weinig vatbaar / 5
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	vatbaar / 2

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 8,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	niet getest / -
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaardadvies + 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaardadvies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

28/35: 22-25 cm (55000 planten/ha)  
35/55: 26-28 cm (49000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Nofy heeft een goede Phytophthora resistentie, zonodig in afrijpend gewas eenmaal een bespuiting uitvoeren.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Nofy niet gevoelig is voor rooibeschatiging maar vrij gevoelig voor stootblauw

## Bewaring

Nofy heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)