

Een midden vroeg saladeras met een goede knolzetting en een goed onderwatergewicht.

- ✓ Vastkokend
- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Goede Y-virusresistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** MA 98-0322 x AR 98-0341
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 05-1440

Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Vleeskleur	geel / 7,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	359
Drogestofgehalte	19,7%
Drogestof verdeling	uitstekend / 8
TGA - gehalte	8,45

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Niet afkiemen. Afkiemen heeft een negatief effect op de knolzetting.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

30/40: 23 cm (58000 planten/ha)
40/50: 26 cm (51500 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft een loofreactie en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Loreley zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Loreley vrij gevoelig is voor rooibeschatting en weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Loreley heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl