

# Andean Sunside.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een laat rijpende diploïde tafelspecialiteit met een krachtige aardappelsmaak en een hoog gehalte aan carotenoïden.

- ✓ Oranje vleeskleur
- ✓ Kruimig kooktype
- ✓ Vrij hoge knolzetting



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2042
- ⦿ **Kruising:** ARD 89-01402 x ARD 88-00883
- ⦿ **Zaailingnummer:** ARD 95-2058

## Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Speciaal

R

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 4
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	oranje / 8,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeisceuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	439
Drogestofgehalte	23,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,3

Chipskwaliteit	matig / 5,5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,  
say **Agrico.**

# Andean Sunside.

Rasbeschrijving consumptie / 2-2

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 8
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	zeer vatbaar / 4
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	niet getest / -
Erwinia	weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5
Virus Yn	vatbaar / 5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 20%, om het onderwatergewicht enigszins te verlagen.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 2x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Andean Sunside vrij resistent is.

## Oogst

Andean Sunside is weinig gevoelig voor stootblauw en vrij gevoelig voor rooibeschadiging, indien mogelijk minimaal 3 weken af laten harden.

## Bewaring

Andean Sunside heeft een zeer zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor af land levering en korte bewaring.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico