

# Alouette.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een middenlaat, veelzijdig roodschillig tafelras, met *Phytophthora* resistentie in loof en knol, geschikt voor de conventionele en biologische teelt.

- ✓ Regelmatige vorm en sortering
- ✓ Geschikt voor diverse gerechten
- ✓ Goede droogtetolerantie

## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2044
- ⦿ **Kruising:** AR 02-139-1 x LAURA
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 04-3153

## Plant- en knolkenmerken

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Rijptijd                      | midden laat / 6   |
| Bloemkleur                    | paars             |
| Hoeveelheid bessen            | geen / 4          |
| Loof: - ontwikkeling begin    | snel / 8          |
| Loof: - ontwikkeling volledig | snel / 8          |
| Loof: - selecteerbaarheid     | gemiddeld / 6     |
| Loof: - stevigheid plant      | vrij stevig / 7,5 |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Vleeskleur          | geel / 7,5            |
| Schilkleur          | rood                  |
| Schilhoedanigheid   | vrij goed / 6,5       |
| Kiemkleur           | rood paars            |
| Knolgrootte         | vrij grof / 7         |
| Knolvorm            | ovaal lang            |
| Regelmaat knolvorm  | regelmatig / 7        |
| Knolzetting         | gemiddeld / 6         |
| Regelmaat sortering | vrij regelmatig / 6,5 |

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers
- ⦿ **Verwerkende industrie** | Koelvers
- ⦿ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Gevoeligheid en kwaliteit

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Kiemrust   | gemiddeld / 6                         |
| Metribuzin | weinig tot niet gevoelig / 8          |
| Bentazon   | redelijk gevoelig / 6                 |
| Talent     | gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6 |
| Ethyleen   | gemiddeld -5% minder knollen / 4      |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Doorwas           | redelijk gevoelig / 6,5      |
| Groei scheuren    | redelijk gevoelig / 6,5      |
| Blauwgevoeligheid | weinig tot niet gevoelig / 8 |
| Rooibeschaadiging | redelijk gevoelig / 6        |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht   | 389             |
| Drogestofgehalte    | 21,1%           |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte       | 3,6             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Chipskwaliteit              | gemiddeld / 6,5      |
| Frietkwaliteit              | gemiddeld / 6,5      |
| Kooktype                    | vrij vastkokend / AB |
| Rauwverkleuring             | weinig gevoelig / 7  |
| Grauwverkleuring (na koken) | weinig gevoelig / 7  |

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F) | resistent / 9          |
| Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C) | partieel resistent / 8 |
| Aardappelmoetheid Pa 2 (D)     | niet aanwezig / -      |
| Aardappelmoetheid Pa 3 (E)     | niet aanwezig / -      |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Phytophthora loof | weinig tot niet vatbaar / 9 |
| Phytophthora knol | weinig tot niet vatbaar / 9 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schurft        | weinig vatbaar / 6   |
| Poederschurft  | weinig vatbaar / 6,5 |
| Fusarium       | weinig vatbaar / 7,5 |
| Erwinia        | niet getest / -      |
| Zwarte spikkel | weinig vatbaar / 7,5 |
| Kringrigheid   | vatbaar / 5,5        |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Virus Bladrol | niet getest / -             |
| Virus A       | niet getest / -             |
| Virus X       | weinig vatbaar / 7          |
| Virus Yn      | weinig tot niet vatbaar / 8 |
| Virus Yntn    | weinig vatbaar / 7          |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Wratziekte F1 (D1)  | resistent / 10    |
| Wratziekte F6 (O1)  | niet aanwezig / - |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / - |

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Poot niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor poten. Maximaal 1x afkiemen. Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Alouette heeft een zeer goede Phytophthora resistentie in loof en knol.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Alouette vrij gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet voor stootblauw.

## Bewaring

Alouette heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring bij 5 graden Celsius, voor verwerkingsdoeleinden niet lager dan 7 graden Celsius. Relatief snel terugkoelen naar de advies temperatuur is aan te raden voor een goede kiemrust.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)