

Romano.

Een midden vroeg, roodschillig consumptieras met redelijke virusresistenties en geschikt voor lange bewaring.

- ✓ Uniforme sortering
- ✓ Midden vroege rijptijd
- ✓ Brede wratziekte resistentie



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** DRAGA x DESIREE
- ⊙ **Zaailingnummer:** MA 63-0062

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	crème / 5
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	lang / 8
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	weinig tot niet gevoelig / 8
Groei scheuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	405
Drogestofgehalte	21,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,1

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Romano.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 7
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringrigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	vatbaar / 5
Virus A	weinig vatbaar / 7
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Romano vrij vatbaar is.

Oogst

Minimaal twee weken wachten met rooien na loofddoding, Romano is enigszins gevoelig voor rooibeschatiging, maar niet voor stootblauw.

Bewaring

Romano heeft een prima kiemrust en is geschikt voor lange bewaring.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl