

Een middenlaat consumptieras met mooie, langovale knollen.

- ✓ Vrij hoge knolzetting
- ✓ Kruidig kooktype
- ✓ Goede droogtetolerantie



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2023
- ⦿ **Kruising:** VULKANO x VOKAL
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 80-045-20

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	stevig / 8

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	groen paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld meer dan 25% meer knollen / 8
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	gevoelig / 5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht	378
Drogestofgehalte	20,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij kruidig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Arinda vrij vatbaar is.

Oogst

Drie weken wachten met rooien na loofdoding is noodzakelijk, omdat Arinda gevoelig is voor rooibeschatiging, maar weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Arinda heeft een zwakke kiemrust en is alleen geschikt voor af land levering of korte bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl