

Een middenlaat consumptieras met een goede opbrengst.

- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Vrij kruimig
- ✓ Brede resistenties



## Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** J. Vegter
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** WY 66-13-636 x AM 66-0042
- ⊙ **Zaailingnummer:** VE 72-13-225

## Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	425
Drogestofgehalte	22,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,9

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5,5

Say potato,  
say **Agrico.**

# Sante.

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	partieel resistent / 7
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	partieel resistent / 7
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	vatbaar / 3

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig tot niet vatbaar / 8
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 9

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Sante vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Sante weinig gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

## Bewaring

Sante heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de korte tot middenlange bewaring (4 maanden).

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)