

Impala.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een vroeg consumptieras met een goede schurftresistentie en een goede opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Brede resistenties
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Böhm
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** BM 72-0052 x BIRANCO
- ⊙ **Zaailingnummer:** BM 78-0286

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	322
Drogestofgehalte	17,8%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6,5
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 3
Fusarium	zeer vatbaar / 4,5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies +10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Impala vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Impala niet gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Impala heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celcius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl