

Een vroeg, fijnvallend, roodschillige tafel- en saladespecialiteit met een excellente smaak.

- ✓ Zeer hoge knolzetting
- ✓ Bijzonder smaak- en bereidingseigenschappen
- ✓ Goede virusresistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Desmazieres
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2041
- ⦿ **Kruising:** FRANCINE x LAURA
- ⦿ **Zaailingnummer:** DM 99-063-07

Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij slap / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	gevoelig / 5
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeisceuren	gevoelig / 5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	391
Drogestofgehalte	21,3%
Drogestof verdeling	uitstekend / 8
TGA - gehalte	5,5

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij kruimig / AB
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	weinig vatbaar* / 6*
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

30/50: 20 cm (67000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft vaak een loofreactie en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Cerisa zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Cerisa weinig gevoelig is voor stootblauw en rooibeschatiging.

Bewaring

Cerisa heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor midden-lange tot lange bewaring bij 4 graden Celsius. Goede kiemrust

Say
growth,
say **Agrico.**

* Resultaten met een sterretje (*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl

