

# Agata.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een zeer vroeg, vrij vastkokend consumptieras met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.

- ✓ Zeer vroege rijptijd
- ✓ Goede virusresistenties
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** BM 72-0052 x SIRCO
- ⦿ **Zaailingnummer:** GE 77-0134

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	redelijk gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	316
Drogestofgehalte	17,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,  
say **Agrico.**

# Agata.

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6,5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6,5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 20%, bij voorkeur in gedeelde gift  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
 35/50: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Agata vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Agata weinig gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

## Bewaring

Agata heeft een matige kiemrust, maar is geschikt voor lange bewaring in kisten bij 3 a 4 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

[www.agrico.nl](http://www.agrico.nl)