

Een veelzijdig, middenlaat tafel- en saladeras, geschikt voor gangbare en biologische teelt.

- ✓ Uitstekende consumptie kwaliteit
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Brede resistenties



Algemene kenmerken

- ◉ **Kweker:** N.Ö.S.
- ◉ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2023
- ◉ **Kruising:** BINTJE x QUARTA
- ◉ **Zaailingnummer:** SW 80-0540

Marktsegment

- ◉ **Retail** | Vers
- ◉ **Retail** | Salade
- ◉ **Geschikt voor de biologische teelt**



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging	gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht	369
Drogestofgehalte	20,2%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	zeer gevoelig / 4
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	weinig vatbaar / 7
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	vatbaar / 5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/50: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Ditta vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Ditta weinig gevoelig is voor stootblauw, maar vrij gevoelig voor rooibeschatiging.

Bewaring

Ditta heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico