

Constance.

Een midden vroeg consumptieras met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.

- ✓ Prachtige uitstraling
- ✓ Midden vroege rijptijd
- ✓ Vrij vastkokend



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** J.L. Spijkman
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2044
- ⊙ **Kruising:** MARABEL x AR 93-1243
- ⊙ **Zaailingnummer:** SA 02-0020

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	licht blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 6,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	zeer gevoelig / 4,5

Onderwatergewicht	358
Drogestofgehalte	19,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,3

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Constance.

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	zeer vatbaar / 4,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 3
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringrigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 15%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 15%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
35/55: 36 cm (37000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Constance vatbaar is.

Oogst

Drie weken wachten met rooien na loofdoding is noodzakelijk, omdat Constance gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet gevoelig voor stootblauw. Constance groeit diep in de rug.

Bewaring

Constance heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl