

Een middenlaat consumptieras met een goede hitteresistentie en een hoge opbrengst.

- ✓ Midden late rijptijd
- ✓ Vrij lange kiemrust
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** F.J. Vos
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2037
- ⊙ **Kruising:** ARMUNDO x ARIELLE
- ⊙ **Zaailingnummer:** VO 96-0077

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5

Vleeskleur	crème / 5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	326
Drogestofgehalte	18,3%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,6

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	zeer vatbaar / 4
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringrigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken.
Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.
Eventueel 2x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Faluka vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, Faluka is vrij gevoelig voor rooibeschatiging en niet gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Faluka heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl