

Een midden vroeg consumptieras met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.

- ✓ Goede schilkwiteit
- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Brede resistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- ⦿ **Kruising:** EVOLUTION x MANITOU
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 07-1082

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	25% meer knollen / 8
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	321
Drogestofgehalte	17,8%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	10

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7,5
Kringerigheid	vatbaar / 5,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	resistent* / 10*
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaardadvies + 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering om dominantie te verbreken.
Maximaal 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Corazon zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Corazon weinig gevoelig is voor rooibeschadiging en stootblauw.

Bewaring

Corazon heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor middenlange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

* Resultaten met een sterretje (*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl

