


Laudine.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een midden vroeg consumptieras met een mooie huid, geschikt voor de retail en thuisfrites.

- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Goede resistentie tegen aardappelmoeheid en virus



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** N. .S.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** LADY FELICIA x B 92/135/267
- ⦿ **Zaailingnummer:** NO 02-0562

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	345
Drogestofgehalte	19%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,7

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6,5
Frietkwaliteit	goed / 7,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	weinig tot niet gevoelig / 8
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	weinig vatbaar / 7
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	zeer vatbaar / 3,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Laudine vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Laudine vrij gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet voor stootblauw.

Bewaring

Laudine heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl