

Een laat consumptieras met een uitstekende schurftresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Grote knollen
- ✓ Hoge knolzetting



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Saatzucht Berding
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2028
- ⦿ **Kruising:** NENA x DUNJA
- ⦿ **Zaailingnummer:** NKG 86-1158

Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Vers

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	niet getest / -
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	380
Drogestofgehalte	20,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	2,4

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te verbreken.

Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)
35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Milva zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Milva weinig gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Milva heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico