

# Excellency.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een midden vroeg, veelzijdig consumptieras met een mooie presentatie en zeer geschikt voor thuisfrites.

- ✓ Goede bakkwaliteit
- ✓ Vrij lange kiemrust
- ✓ Hoog onderwatergewicht



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2042
- ⦿ **Kruising:** LADY OLYMPIA x RED ONE
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 98-1196

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	gemiddeld / 6
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 6,5
Metribuzin	zeer gevoelig / 4
Bentazon	gevoelig / 5
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% minder tot 5% meer knollen / 5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	399
Drogestofgehalte	21,6%
Drogestof verdeling	goed / 7
TGA - gehalte	4,2

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	goed / 7
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	vatbaar / 5
Fusarium	vatbaar / 5
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	weinig tot niet vatbaar / 8

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

30/50: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin wordt afgeraden, dit geeft vaak een flinke loofreactie en forse opbrengstderiving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Excellency vrij vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Excellency gevoelig is voor rooibeschatiging maar weinig gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Excellency heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 7 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)