

# Ardeche.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een middenlaat zetmeelras met een goede opbrengst, Phytophthora resistentie in loof en knol en geschikt voor de productie van vlokken.

- ✓ Goede zetmeelopbrengst
- ✓ Brede aardappelmoeheid resistenties
- ✓ Goede virusresistenties

## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- ⦿ **Kruising:** STAYER x AR 02-2139
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 07-2451

## Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Vlokken
- ⦿ **Verwerkende industrie** | Zetmeel
- ⦿ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Plant- en knolkenmerken

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Rijptijd                      | midden laat / 5,5 |
| Bloemkleur                    | wit               |
| Hoeveelheid bessen            | gemiddeld / 6     |
| Loof: - ontwikkeling begin    | snel / 8          |
| Loof: - ontwikkeling volledig | snel / 8          |
| Loof: - selecteerbaarheid     | gemiddeld / 6,5   |
| Loof: - stevigheid plant      | vrij stevig / 7,5 |

## Gevoeligheid en kwaliteit

|            |   |
|------------|---|
| Kiemrust   | gemiddeld / 5,5   |
| Metribuzin | weinig tot niet gevoelig / 8  |
| Bentazon   | weinig tot niet gevoelig / 8  |
| Talent     | gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4<br>gebruik van talent kan mutantvorming geven |
| Ethyleen   | gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7  |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Doorwas           | redelijk gevoelig / 6 |
| Groeischeuren     | redelijk gevoelig / 6 |
| Blauwgevoeligheid | zeer gevoelig / 4,5   |
| Rooibeschaadiging | redelijk gevoelig / 6 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht   | 474             |
| Drogestofgehalte    | 25,3%           |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte       | 4,7             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Chipskwaliteit              | gemiddeld / 6           |
| Frietkwaliteit              | onvoldoende / 4         |
| Kooktype                    | kruidig / C             |
| Rauwverkleuring             | niet getest / -         |
| Grauwverkleuring (na koken) | redelijk gevoelig / 6,5 |

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F) | resistent / 9          |
| Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C) | resistent / 9          |
| Aardappelmoetheid Pa 2 (D)     | resistent / 9          |
| Aardappelmoetheid Pa 3 (E)     | partieel resistent / 7 |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Phytophthora loof | weinig tot niet vatbaar / 9 |
| Phytophthora knol | weinig tot niet vatbaar / 9 |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schurft        | weinig vatbaar / 6   |
| Poederschurft  | weinig vatbaar / 6,5 |
| Fusarium       | niet getest / -      |
| Erwinia        | niet getest / -      |
| Zwarte spikkel | weinig vatbaar / 7   |
| Kringrigheid   | weinig vatbaar / 6   |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Virus Bladrol | niet getest / -               |
| Virus A       | niet getest / -               |
| Virus X       | niet getest / -               |
| Virus Yn      | weinig vatbaar / 6            |
| Virus Yntn    | weinig tot niet vatbaar / 8,5 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Wratziekte F1 (D1)  | licht vatbaar / 8 |
| Wratziekte F6 (O1)  | licht vatbaar / 8 |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / - |

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaardadvies + 10%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaardadvies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.  
Maximaal 1x afkiemen.

## Plantafstand

28/35: 20 tot 22 cm (60500 planten/ha)  
35/55: 25 tot 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Ardeche heeft een goede Phytophthora resistentie, zonodig in afrijpend gewas eenmaal een bespuiting uitvoeren.

## Oogst

Bij voorkeur drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Ardeche gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

## Bewaring

Ardeche heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor een middenlange bewaring bij 8 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)