



Een middenlaat, hoogopbrengend verwerkingsras voor de frites- en droog industrie.

- ✓ Grove knolen
- ✓ Hoog onderwatergewicht
- ✓ Geschikt voor diverse grondsoorten

## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2028
- ⦿ **Kruising:** AGRIA x AR 76-034-03
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 87-1140

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 5,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5,5
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Frites
- ⦿ **Verwerkende industrie** | Chips
- ⦿ **Verwerkende industrie** | Vlokken

P

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	430
Drogestofgehalte	23,2%
Drogestof verdeling	gemiddeld / 6,5
TGA - gehalte	6,1

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	goed / 7,5
Kooktype	kruidig / BC
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6,5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	matig vatbaar / 6
Wratziekte F6 (O1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 30%, gebruik van dierlijke mest is mogelijk.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 2x afkiemen.

Weinig verschil in pootgoed behandeling.

## Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)

35/50: 33 cm (40000 planten/ha)

50/55: 40 cm (33000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Fontane vrij vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Fontane niet gevoelig is voor rooibeschatiging en vrij gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Fontane heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 7 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)