

Een middenlaat, roodschillig consumptieras met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Brede wratziekte resistentie



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** G. Kuik
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2025
- ⊙ **Kruising:** AR 76-199-03 x KO 80-1407
- ⊙ **Zaailingnummer:** KK 83-0216

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	paars
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	lang / 8
Metribuzin	gevoelig / 5
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	426
Drogestofgehalte	23%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	zeer gevoelig / 4,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	vatbaar / 5,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 10%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 20%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken.

Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Eventueel 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)

35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin geeft vaak een loofreactie en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Kuroda vrij vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Kuroda vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Kuroda heeft een prima kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl