

Ardeche.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een middenlaat zetmeelas met een goede opbrengst, Phytophthora resistentie in loof en knol en geschikt voor de productie van vlokken.

- ✓ Goede zetmeelopbrengst
- ✓ Brede aardappelmoeheid resistenties
- ✓ Goede virusresistenties

Algemene kenmerken

- **Kweker:** Agrico Research B.V.
- **Kwekersrecht EU:** 31-12-2048
- **Kruising:** STAYER x AR 02-2139
- **Zaailingnummer:** AR 07-2451

Marktsegment

- **Verwerkende industrie** | Vlokken
- **Verwerkende industrie** | Zetmeel
- **Geschikt voor de biologische teelt**



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 5,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% minder knollen / 4
vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden	
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	matig / 4
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	zeer gevoelig / 4,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	474
Drogestofgehalte	25,3%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,7

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	kruidig / C
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	partieel resistent / 7

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	niet getest / -
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaardadvies + 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaardadvies + 20%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.
Maximaal 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 20 tot 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 25 tot 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Ardeche heeft een goede Phytophthora resistentie, zonodig in afrijpend gewas eenmaal een bespuiting uitvoeren.

Oogst

Bij voorkeur drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Ardeche vrij gevoelig voor rooibeschatiging en zeer gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Ardeche heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor een middenlange bewaring bij 8 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl