


Een middenlaat consumptieras met vrij grove knollen en een vrij goed onderwatergewicht.

- ✓ Goede schilkwiteit
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Geschikt voor diverse gerechten



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** NICOLA x RED BARON
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 04-0087

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	stevig / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7,5
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	374
Drogestofgehalte	20,4%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,56

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)

35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Adato vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Adato weinig gevoelig is voor rooibeschatting en enigszins gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Adato heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden).

Say
growth,
say **Agrico.**