

Een middenlaat, roodschillig consumptieras met een goede hitteresistentie en een zeer hoge opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Relatief hoog onderwatergewicht
- ✓ Goede bewaarbaarheid



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Konst Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** KO 61-0333 x WILJA
- ⊙ **Zaailingnummer:** KO 67-0593

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder tot 5% meer knollen / 5 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij onregelmatig / 5,5
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groei scheuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	385
Drogestofgehalte	20,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,2

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	matig / 5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig vatbaar / 6
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	zeer vatbaar / 4,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	weinig vatbaar / 7,5
Erwinia	zeer vatbaar / 3
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	weinig vatbaar / 6
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yn	vatbaar / 5,5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 10%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)

35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, alhoewel Kondor weinig vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Kondor enigszins gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet voor stootblauw.

Bewaring

Kondor heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**