

Een laat, roodschillig consumptieras met een goede schil en een hoge opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Brede aardappelmoeheid resistenties



Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2037
- ⦿ **Kruising:** LAURA x MARANCA
- ⦿ **Zaailingnummer:** MA 96-0419

Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	laat / 5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	zeer gevoelig / 4
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschatiging	gevoelig / 5,5

Onderwatergewicht	351
Drogestofgehalte	19,4%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,4

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7
Kringerigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Vaker dan 1x afkiemen geeft een onregelmatige opkomst.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin wordt afgeraden, dit geeft vaak een flinke loofreactie en forse opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Manitou vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Manitou vrij gevoelig is voor rooibeschatiging, maar niet voor stootblauw.

Bewaring

Manitou heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl