



Een middenlaat, hoog opbrengend consumptieras met een goede hiteresistentie.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Goede schurft- en virusresistenties

Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2034
- ⊙ **Kruising:** ARMUNDO x AR 85-022-07
- ⊙ **Zaailingnummer:** AR 92-0314

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	makkelijk / 8
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	zeer gevoelig / 4
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld meer dan 25% meer knollen / 8
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	gevoelig / 5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	323
Drogestofgehalte	17,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	zeer vatbaar / 4

Schurft	weinig vatbaar / 6,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 3
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6,5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 5%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Poot niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor poten.

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting. Eventueel 1x afkiemen.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)

35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin wordt afgeraden, dit geeft vaak een flinke loofreactie en forse opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Zafira vrij vatbaar is.

Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Zafira vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Zafira heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

www.agrigo.nl