

Een middenlaat chipsras met een goede opbrengst en een goed onderwatergewicht.

- ✓ Goede chipskwaliteit
- ✓ Goede bewaarbaarheid
- ✓ Midden late rijptijd



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** LADY CLAIR x ARG 96-0865
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 05-1887

## Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Chips

P

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 5,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld meer dan 25% meer knollen / 8
Ethyleen	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	gemiddeld / 5,5
Kiemkleur	donker rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	441
Drogestofgehalte	23,7%
Drogestof verdeling	gemiddeld / 6,5
TGA - gehalte	5,33

Chipskwaliteit	goed / 7
Frietkwaliteit	matig / 6
Kooktype	kruimig / C
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6,5

Schurft	weinig vatbaar / 7
Poederschurft	zeer vatbaar / 4,5
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting. Eventueel 1x afkiemen.

## Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Corsica vrij vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Corsica weinig gevoelig is voor rooibeschaadiging en stootblauw.

## Bewaring

Corsica heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 9 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)