Riviera.

Een zeer vroeg consumptieras met een mooie huid, uitstekende hitte- en virusresistenties en vroeg een goede opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Mooie presentatie
- ✓ Goede virusresistenties

Algemene kenmerken

- **Kweker:** **Mts. Boerhave**
- **Kwekersrecht EU:** **31-12-2030**
- **Kruising:** **MINERVA x ALCMARIA**
- **Zaailingnummer:** **BH 86-0266**

Marktsegment

T

- **Traditioneel**

Plant- en knolkarakteristieken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6,5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal rond
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	matig / 5
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	niet getest / -
Talent	gemiddeld -5% minder knollen en/of mutantgevoelig / 4 gebruik van talent kan mutantvorming geven
Ethyleen	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	318
Drogestofgehalte	17,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	gevoelig / 5,5

Say potato, say Agrico.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

© Agrico V209

Riviera.

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent* / 9*
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -
Phytophthora loof	zeer vatbaar / 3
Phytophthora knol	vatbaar / 5
Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	vatbaar / 5,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4
Virus Bladrol	weinig vatbaar / 7
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Say growth, say Agrico.

* Resultaten met een sterretje (*) zijn op basis van eigen onderzoek en nog niet officieel gepubliceerd.

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

Bemesting[1]

Stikstof: standaard advies + 10%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Riviera zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Riviera weinig gevoelig is voor rooibeschadiging en niet gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Riviera heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor af land levering en korte bewaring.

Agrico
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl

© Agrico V209