


Een middenlaat consumptieras met mooie knollen en een vrij goed onderwatergewicht.

- ✓ Goede schilkwaliteit
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Geschikt voor diverse gerechten



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** NICOLA x RED BARON
- ⦿ **Zaailingnummer:** SW 04-0087

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 6
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	stevig / 8

Vleeskleur	crème / 5,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7,5
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7,5
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7,5
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	374
Drogestofgehalte	20,4%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,56

Chipskwaliteit	gemiddeld / 6
Frietkwaliteit	gemiddeld / 6,5
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	weinig gevoelig / 7
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7,5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	vatbaar / 5
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 20%, liefst gedeeld en de 2e gift tijdens de knolzetting.

Fosfaat: standaard advies

Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.

Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)

35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Adato vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Adato weinig gevoelig is voor rooibeschatting en enigszins gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Adato heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4,5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)